【ダイエット自費診療②】

マンジャロ皮下注射

【マンジャロ（皮下注射）】

体重減少効果のある GIP 受容体及び GLP-1 受容体作動薬になります。週 1 回の間隔で注射をする薬剤です。

BMI が 21kg/㎡以上の方が対象です。18 歳～70 歳までの方が対象となります。

血糖値の上昇を抑え、食欲抑制、満腹感の持続のような効果のため、無理な食事制限をする必要はありません。

【用法・用量】

週 1 回、初期用量 2.5mg　4 週使用後、通常量 5.0mg、腹部、太もも、または上腕に皮下射。

必要に応じて徐々に増量（最大 15mg）。同じ曜日に注射することを推奨。

マンジャロ　2.5mg/1 本	7,500 円/1 箱 2 本/2 週間分
マンジャロ　5.0mg/1 本	15,000 円/1 箱 2 本/2 週間分
マンジャロ　7.5mg/1 本	18,000 円/1 箱 2 本/2 週間分

（税込）

初診料・再診料（月 1 回）1000 円（税込）

【副作用】

悪心、嘔吐、下痢、便秘、消化不良、膨満感（これらは通常、投与初期や増量時に見られ時間とともに軽減する）

重大な副作用は、急性膵炎、低血糖、胆嚢炎、肝・腎機能障害、アナフィラキシーショック、血管性浮腫

【禁忌】

下記の方は、使用できません

① 膵炎の既往　②重症胃腸・肝・腎障害　③摂食障害・痩せている（BMI21 未満）

④他の GLP-1 製剤を使用（併用不可）⑤栄養不良・アルコール依存症　⑥妊婦

⑦小児（18 歳未満）・高齢者（70 歳以上）

うかいファミリークリニック